Homoki Gazda

Ingyenes mezőgazdasági információs és kereskedelmi lap

WEB-oldal: www.moraagro.hu

III. évfolyam 8. szám — Terjeszti Magyar Posta — 2006. Augusztus

Szerkesztő: Horváth Péter — Nyomdai munkák: Modok és Társai Kft. Kiskunhalas. Felelős vezető: Modok Balázs — Regisztrációs szám: 2.2.4/1616/2003.

Kwizda

Magyar Kwizda

Táplálunk és védünk - a zöldség- és a gyümölcs kultúrákban

KUPFER FUSILAN® WG

- Peronoszpóra és fitoftóra ellen más kultúrákban is
- Magas hatóanyag tartalom
- Kontakt és lokálszisztémikus hatás
- Nem porzik
- Permetlékészítés néhány másodperc alatt

CUPROXAT® FW

- Gombák és baktériumok ellen is (tafrina, peronoszpóra, fitoftóra, tűzelhalás, monília)
- Kiemelkedő biológiai hatás
- Extra finom szemcseméret
- Tökéletes fedés, kiváló esőállóság
- Könnyű kezelhetőség

Talstar 10 EC

- Taglózó hatású rovarölo szer szívó- és rágó kártevok ellen
- Atkairtó mellékhatás
- Fénystabil, 3-5 napos tartamhatás

WUXAL® Ascofol

- A zöldségfélék ideális nyári lombtrágyája
- Magas növényi hormon- és mikroelem tartalom
- Magas biológiai hatékonyság
- Növények stressztűrő képességének fokozása
- Permetlé minőségét javító adalékanyagok

Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét!

1027 Budapest, Medve u. 24.
Tel.: 1-224-7300, fax: 1-212-0873
E-mail: kwizda@kwizda.hu
Honlap: www.kwizda.hu

Magyar Kwizda — Táplálunk és védünk

A FOSFITEX-ről, mint új anyagról újra!

Az idei év júniusától van a magyar piacon ez a világszerte sok helyen már igen nagy mennyiségben használt, a növények immunrendszerét fokozó környezetbarát tápanyag.

A speciális fosfit forma permetezőszerként használva a növények levelein keresztül gyorsan felszívódik és a növény más részeibe is rövid időn belül eljut, s mivel mind lefelé, mind felfelé könnyen mozog a növényben, ezért a gyökerekben is kifejti hatását. Tápanyagként alkalmazva mikroszóróval, vagy csepegtetővel kijuttatva a gyökéren keresztül is gyorsan felszívódik és eljut a növény hajtáscsúcsába is. A fosfit forma beindítja a növények fitoalexin képzését, mely vegyületekkel a gombák támadásai ellen védekeznek. A Fosfitex összetétele a növények fejlődését minden fejlődési szakaszban segíti, fokozza a keményítők, cukrok, zsírok szállítását a termés felé, s ezzel a termés ízesebb, jobban tárolható, jobban pulton tartható lesz.

Felhasználási javaslat:

S az eltelt időszak pár gyakorlati tapasztalata:

Görög és **sárgadinnyében** alkalmazva a gombabetegségek kifejlődését, elterjedését akadályozta, az indák fejlődését elősegítette. A növény életerősebb lett.

Burgonya: Jégverés után alkalmazva a sebek gyógyulását gyorsította, a fitoftóra kialakulását lassította.

Őszibarack: Jégverés után a sebek gyógyulását gyorsította, a levéllikasztó fertőzést mérsékelte.

Növény	Javasolt adag	Lombtrágyázásnál javasolt vízmennyiség	Ismétlések
Saláta, jégsaláta, kínai ke	2 l/ha	400-600 liter	10-14 nap
Uborka	3-4 l/ha	400-600 liter	14 nap
Paprika	2-3 l/ha	500-900 liter	14 nap
Paradicsom	2-3 l/ha	400-1000 liter	4-5 Alkalommal
Görögdinnye, sárgadinnye	1-1,5 l/ha Max. 0,3 %	400-600 liter	4-6 alkalommal
Hagyma,fokhagyma	2,5-3 l/ha	400-600 liter	3-4 alkalommal
Burgonya	2,5-3 l/ha	500-900 liter	3-5 alkalommal
Káposztafélék	2-3 l/ha	500-600 liter	4 alkalommal 7-10 naponként
Szamóca	talajon 10-15 l/ha lombon 2-3 l/ha	400-600 liter	2-3 alkalommal
Szőlő	2-3 l/ha	400-1000 liter	virágzástól havonta 1 szer
Bogyós gyümölcsűek	3-4 l/ha	400-800 liter	virágzástól havonta 1 szer
Faiskola	2-3 l/ha talajon		havonta 1 szer 6-8 ml/m2

Sárgarépa, petrezselyem, zeller: Hatására a phytium gomba nem tudott kialakulni, ezért a répa az apró repedésektől mentes maradt, míg a petrezselyem és zeller gyökerén máskor gyakran megjelenő narancssárga rothadásos foltok elmaradtak, vagy minimális mértékre csökkentek.

Mivel ennek az anyagnak nincs élelmezés-egészségügyi várakozási ideje, ezért még a szedés alatti alkalmazására is van mód. Az életerősebb növény pedig lehetőséget biztosít egy-egy növényvédő szeres kezelés elhagyására.

Másik nagy jelentősége, hogy a kis kultúrákban is nyugodtan használható, mivel az EU-ban tápanyagként van engedélyezve, ezért a magyar piacon is minden további nélkül forgalomba hozható, és azokban a kis kultúrákban ahol nincs gyakorlatilag egyetlen növényvédő szernek sem engedélye, ott bátran eredménnyel használhatjuk.

Saláta termelők figyelem: a FOSFITEX jó eredményekkel szerepelt külföldön a saláta peronoszpóra ellen. Érdemes kipróbálni.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

AKCIÓ! Őszi fólia és műtrágya akció!

A KITE ZRt Kertészeti Üzletága szeptember 01-től az idén is meghirdeti őszi sátorfólia és műtrágya akcióját.

Kedvező áron kínálunk ***magyar és spanyol kiváló minőségű sátorfóliákat***.

Műtrágya akciónkban 69.000 Ft + Áfa-s tonnánkénti áron kínáljuk a ***Multicare 5-10-25*** alap- és fejtrágyaként is felhasználható csökkentett klórtartalmú kertészeti műtrágyáját, mely felhasználható az őszi alaptrágyázáshoz.

Az akció a készlet erejéig érvényes.

KITE ZRt.

Az akcióval kapcsolatban érdeklődni lehet szaktanácsadóinknál:

Noel Gábor
Bács-Kiskun megye
30/2498-079

Gyói Gábor
Csongrád megye
30/2072-448

Aki a syngenta-val véd … bizton arat

Augusztusi aktualitások a növényvédelemben

A nyárutó hava, augusztus van. Szép ez a hónap. A szeretett föld szinte ontja ajándékait, meghálálva ezzel a mezőn és a kertben végzett sok gondos munkát.

A gabonaaratás befejeződött. Betakarítottunk. Ez mindig megnyugtató érzés, még ha kétségei vannak is a gazdának az értékesítés felől, mert legalább fedél alatt van az idei, jó minőségű, bő termés.

A bogyós gyümölcsűek mindegyike; a csonthéjasok közül a cseresznye, a meggy és a kajszi már leérett, de az őszibarack legízletesebb fajtái most érnek. A pirosodó szilvák hamvas kékre változtak és az almásokban kezdődik a készülődés a gyümölcsszedésre. A szőlőkben itt az ideje a záró permetezéseknek, mert a korai fajták szürete nemsokára kezdődik.

Ilyenkor van a gazdának egy szusszanásnyi ideje, hogy belefeledkezzen gondolataiba és délutánonként belehasítson késével egy kongó, harsogva repedő, szomjoltó, édes húsú dinnyébe. De sok lazításra sajnos nincs mód, mert van még bőven teendő a növényvédelemben is.

Legyen gondos a tarlóművelés

A tarlóművelés több fontos műveletet takar, melynek első lépése a tarlóhántás vagy tarlótörés. Ennek célja sokrétű.

A tarlóművelésnek a learatott gabonatábla további gondozásának a föld nedvességtartalmának megóvását, a terület további művelhetőségét és gyommentességét kell biztosítani. Ezek alapozzák meg a következő vetés, illetve kultúra sikerét. Ennek a műveletsornak az első lépése a 8-10 cm mélyen történő sekély tarlóhántás, amelynek felszínét minél előbb le kell zárni. Ez a származadványok, gyökerek és az aratás előtt kikelt gyomok felapritását, lefedését, elbomlását, a talajnedvesség megőrzését és a föld jobb beéredését szolgálja. Az ilyen területen jó „magágy" alakul ki az árva és az eddig nem csírázott gyomok keléséhez.

A gondosan hántott talajban gyorsabban kelnek ki a visszamaradó csíraképes gyomok és előbb tör a felszínre az árvakelés. Ez az első lépés; tehát a gyomok kelését elősegítő állapot létrehozása, a második a **kikelt gyomok** és az **árvakelés elpusztítása**, még a maghozás előtt. Ha ez elmarad, nem teljesül a tarlógondozás egyik fő feladata. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul teljesüljön, ehhez nyújt korszerű és biztos megoldást a Syngenta **Medallon Prémium** tarlókezelő gyomírtószere.

Mi is történik a tarlón

A tarlóhántás utáni sekély talajművelés és a talaj lezárása után nem csak az évelő gyomok, a magról kelők de az árvakelés is feltör. A hántolt tarló kizöldül. A sok bajt okozó acat, tarack és fenyérárok valamint egy sor nyáron kelő gyom ekkor szinte kínálja magát egy hatékony és eredményes megoldáshoz.

Megoldás … Medallon Premium

A *Medallon Prémium* speciális összetételének köszönhetően kiemelkedik az erre a célra használható gyomírtószerek közül:

- jobban tapad a gyomokra
- nincs ionantagonizmus
- tökéletesen felszívódik
- elmozdulása a gyomnövényekben kiváló
- a gyomokat tökéletesen elpusztítja

A *Medallon Prémium* rendkívül széles hatásspektrummal és széles felhasználási területtel rendelkezik. Kiírtja az összes évelő és magról kelő gyomot.

A tarlót így tisztítsuk meg a gyomoktól:

- *Ha sok a **mezeiacat**, akkor a gyomok tőleveles állapotában, gyomírtsunk.*
- ***Fenyércirok** fertőzésnél 20-30 cm nagyságnál végezzük a Medallon Prémium permetezést. Ezzel a kezeléssel a **tarackosokat** és a kikelt **magról kelő gyomokat** is elpusztítjuk.*
- *A **Medallon Prémium adagja** 4-5 l/ha 200-250 l vízzel kijuttatva.*
- ***Ha háti géppel végezzük a gyomírtást, használjunk 1,5-2%-os permetlevelet**, 10 l vízhez 1,5-2 dl Medallon Prémium.*
- *A gyomírtó hatást 4-6 kg/ha ammonium-szulfát, vagy -nitrát műtrágya fokozza.*

A gyomírtás utáni első talajmunka tárcsázás vagy szántás 10-14 nap után végezhető.

A Medallon Prémiummal gyommentessé tett táblát tisztán adjuk át a következő kultúrának, így a jövő évi gyomírtó vegyszerezés eredményesebb és olcsóbb lesz.

Ne feledjük: a gondos tarlóművelés esély a talaj megújulására.

A burgonya lombtalanítás megkönnyíti a felszedést … de van más előnye is

A burgonytermesztés felszedés előtti utolsó művelete a lombozat eltávolítása. Ez szárzúzással vagy vegyszeres eljárással érhető el. A **lombtalanítás** nem csak a betakarítást könnyíti meg, de **elősegíti a gumók gyorsabb érését, megakadályozza** a vírusterjesztő **levéltetvek** késői **betelepedését** és számos **betegségek továbbterjedését.**

A **Reglone** a lombtalanítás, vagyis lombperzselés már több évtizede bevált és legnagyobb felületen használt kémiai eszköze. A Reglone kontakt hatású, lombperzselő szer. Hatása gyors és drasztikus. A lombpermetezésre lehetőleg a szélcsendes kora reggeli és késő délutáni órákban kerüljön sor, amikor a hőmérséklet alacsonyabb és magasabb a páratartalom. A kezelés környezetében lévő növényeket esetlegesen károsító permet elsodródásának veszélye így elkerülhető.

A permetlé mennyisége a leperzselendő zöld lombtömeg nagyságától függ. Szántóföldi permetezőgépnél általában 200-400 l/ha vízmennyiség szükséges.

A permetlé készítésénél ügyfejünk arra, hogy a koncentráció ne csökkenjen 1,5% alá. 100 l permetléhez minimum 1,5 l Reglone szükséges. A permetezést 150 mikronnál nagyobb cseppeket produkáló szórófejekkel végezzük.

A Reglone 40 adagolása:

Étkezési burgonya lombtalanítására: 4,3 l/ha, 200-400 l vízzel kijuttatva

Vetőburgonya lombtalanítására: 5,2 l/ha, 400-600 l vízzel kijuttatva

Kisebb területre készítsünk 1%-os permetlevet

Vetőburgonyában különösen a nagy lombozatú fajtáknál **osztott kezelés** javasolt először 2,5 l/ha Reglone, majd 3-5 nap után ismét 2,5 l/ha Reglone kipermetezésével. A Reglone hatása 4 kg/ha ammoniumnitrát hozzáadásával még fokozható.

Mi veszélyeztet az almásban augusztusban

Az idei páratlan erősségű **varasodás és lisztharmat járvány** és a hó eleji gyakori heves esőzések miatt továbbra is masszív védelemre van szükség. Ez különösen akkor fontos, ha el akarjuk kerülni a raktározás alatt kialakuló apró pettyes varas foltok jelentkezését, amit a betároláskor a tünetmentes alma bőrén előforduló spórák okoznak. Ezért fokozott szerepe van az augusztusi alapos kontaktszeres permetezésnek. Jó szolgálatot tesz a felületen ható, ekkor is kitűnő tapadó képességű **Bravo 500** vagy a **Delan.**

A **lisztharmat** elleni védelemre a záró permetezésekhez ideális választás ha a fent említett szerek egyikét kombináljuk az atkákat is erősen gyérítő, a permetlében azonnal oldódó mikroszemcsés **Thiovit Jet**-tel *(olvasd: tiovit dzset)*.

Az állati kártevők közül augusztusban a gyümölcsre boruló levelek védelmében meghúzódó, az almát kiodvasítva összerágó **almailonca és sodrómoly hernyók** nyári nemzedéke okozza a legnagyobb gondot. Emellett az almamoly és az aknázók is tovább veszélyeztetnek. Most van itt az ideje igazán a biológiai hatású **Match**-nek. A Match mint speciális kitinszintézisgátló a hernyókat kelésük pillanatától minden lárvastádiumban, még a fejlett bábozódás előtt álló állapotban is nagy hatékonysággal pusztítja. Az ilonca ellen ez az egyik leghatékonyabb készítmény.

Almailonca rágása

Ugyanakkor a Match a hernyókon kívül minden hasznos rovart megkímél. Az emberre és az élő környezetre veszélytelen. Nem méregként

hat a hernyókra, csak továbbfejlődésüket gátolja meg. A Match ezért valóban a XXI. század elvárásainak maradéktalanul megfelelő, modern rovarölőszer. Ha rágó hernyókon kívül a levél és a pajzstetvek ellen is védekezni kell, válasszuk a **Basudin 600**-at.

Ha közel van a szüret és túl sok a lepke, gyors beavatkozásra van szükség. A taglózó hatású **Karate Zeon** hárítja a bajt. A Karate Zeon közvetlen a szüret előtt is használható.

Almában javasolt szerek adagolása:

Bravo 500	2,5 3 l/ha
vagy	300 ml/100 l
Delan 750 SC	0,5 l/ha
vagy	50 ml/100 l
Match 050 EC	0,8 l/ha
vagy	80 ml/100 l
Basudin 600 EW	1,5 l/ha
vagy	150 ml/100 l
Karate Zeon	0,3 l/ha
vagy	30 ml/100 l
Thiovit Jet	5 7 kg/ha
vagy	0,6 kg/100 l

Érdemes megszívlelni: A hullott almákat hetenként szedjük fel és semmisítsük meg, így csökkenthetjük a további fertőzési lehetőségeket.

Mi veszélyeztet őszibarackban augusztusban

A későn érő fajtákat mint az Elberta, Hale, Shipley még legalább kétszer permetezni kell a gyümölcsszedés előtt a **lisztharmat** és a **levéllyukasodás**, valamint a **keleti gyümölcsmoly** III. nyári nemzedékének hernyói ellen. A betegségek ellen ekkor jó szolgálatot tesz a **Thiovit Jet**, mert a kórokozókon kívül

Lisztharmat őszibarackon

sakkban tartja az ekkor felszaporodó **atkákat** is. Ha a gyümölcsmolyok tömeges rajzását észleljük, akkor a késői fajták gyümölcse és a hajtások veszélyben vannak. Legcélszerűbb ezért a **Thiovit Jet**-et **kombináltan** használni, a molyhernyók behatását meggátló és elpusztító **Basudin 600-al** vagy a **Karate Zeonnal**.

Ha több menetes a szüret, a Karate Zeon-ra feltétlen szükség van. Mindkét utóbbi rovarölőszer védelmet ad a **levéltetvek** ellen és az augusztusban rajzó **kaliforniai pajzstetű** III. lárva nemzedéke ellen.

Thiovit Jet adagja	5 7 kg/ha
vagy	0,6 kg/100 l
Basudin 600 adagja	1,5 l/ha
vagy	150 ml/100 l
Karate Zeon adagja	0,3 l/ha
vagy	30 ml/100 l

Várakozási idők: A Thivoti Jet nincs korlátozva, a Basudin 600 10 nap, a Karate Zeon 3 nap.

Mi veszélyeztet a szőlőben augusztusban

Most jött el a szőlőben a **záró permetezések** ideje. A **peronoszpóra** és a **lisztharmat** elleni védelem változatlanul fontos, mert ha a lombozat sérül, a betegségektől csökken az asszimiláció és a cukortartalom, ami a fürtök minőség romlásával jár.

A záró permetezésekhez leginkább természetes anyagokat, **réz** és **kén** tartalmú szereket érdemes használni, mert ezek a betegségek elleni védelem mellett erősítik a levelek és a fürt bőrszövetét, lefékezik a hajtások növekedését, segítik a vesszők beérését és télállóságát.

A réz készítmények közül a rézhidroxid hatóanyagok a legkívánatosabbak, mert ezek hatása megegyezik a 100 éven át használt Bordóilé-vel. Az ionos réz fertőtleníti az egész tőkét és a peronoszpóra mellett elpusztít sok egyéb gomba spórát. A választék bőséges; Champion, Cuproxat, Funguran, Kocide, Vitra, stb. bármelyik jó szolgálatot tesz a két záró permetezéshez.

Lisztharmat ellen a mikroszemcsés, azonnal oldódó **Thiovit Jet** kitűnő partnere a rézkészítményeknek. A Thiovit nem csak a lisztharmat gomba, de számos rovar és atka tevékenységét is korlátozza.

A Thiovit Jet adagja 5 7 kg/ha vagy 0,6 kg/100

A szőlők őszi réme a szürkepenész

Ha esős az augusztus vége és a szeptember, a **szürkepenész** vagy **botritisz** tönkreteheti az egész évben gondosan megvédett termést. A cukrosodó bogyók héja barnul, egérszürke penészgyep lepi be, minőségük romlik és a must hibás, silány és nehezen kezelhető lesz.

Szerencsére van megoldás ... Chorus


Szürkerothadás

Mindenek előtt az első záró permetezéshez a réz és a kén mellé adjunk **Basudin 600**-at, hogy megakadályozzuk a **tarka szőlőmoly** III. nemzedékű hernyóinak a bogyók bőrszövet megsebző kártételét, mi tárt kaput nyit a szürkepenész behatolásának. Ha a Basudin 600-al a bogyók bőrének épségét biztosítjuk, a felszívódó Chorus csapadékos, párás hajlamosító időjárás esetén is megvédi a fürtöket a szürkepenésztől. A Chorus-szal permetezett fürtök bogyói mint egy gyöngyszem tiszták és épek maradnak a szüretig.



Aki egészséges szürkepenész mentes, kifogástalan és értékes szőlőt kíván szüretelni főleg a vékonyhéjú, botritisz érzékeny fajtáknál, mint a Chardonai, Ezerjó, Leányka, Kékfrankos, Kadarka ott az augusztusi első zárópermetezésse l kombinált Chorus használata többszörösen megtérül.

A **Chorus 75 WG adagja** 0,5 kg/ha vagy 50 g/100 l

További információkért készséggel áll rendelkezésére a Syngenta területi munkatársa Töröcsik Éva (20) 964 78 12 számon.

Végezetül minden gazdának és partnerének bőséges, egészséges termést, szélesedő piacot és kedvező értékesítési lehetőséget kíván a Syngenta szakembergárdája.

dr. Sárospataki György
növényvédelmi konzulens

Tisztelt Őstermelők!

Utolsó lehetőség augusztusban, hogy még 15 % Áfával vásároljon növényvédő szert, műtrágyát, vetőmagot. Használja ki.

Törzsvásárlóinknak ebből az árból a kedvezmény természetesen ugyan úgy jár.

Tisztelettel: Knipf Róbert

Talajfertőtlenítő AKCIÓ:

Basamid G	20/1	42,947 Ft/db
Ipam 40	50/1	20,721 Ft/db
Vydate 10 G	10/1	66,721 Ft/db
Vydate L	5/1	18,200 Ft/db
Force 1,5 G	20/1	35,961 Ft/db
Force 10 CS	1/1	19,834 Ft/db
Nemathorin	4/1	29,120 Ft/db

Fenyő fűrészáru értékesítés!

Mérettől függetlenül ***49.500*** *Ft/m³* [Áfa-s ár]

(deszka és gerenda egyaránt)

Mórahalom, V ker. 85. szám alatt

a Kertészek kis/Nany Áruháza Kft. telephelyén



ÉRVEINK AZ ÁRAINK!

Vállalunk:

- szántóföldi permetezést,
- speciális aprómag vető géppel (AGRICOLA) sárgarápa, petrezselyem, kínai kel, hagyma, japánretek vetését,
- fólia alatti és szántóföldi ásógépezést, talajmarózást,
- fű és lucerna kaszálást,
- gyomirtó és folyékony talajfertőtlenítő egymenetes bedolgozását fólia alatt is.

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Mórahalom V. kerület 85.
Tel.: 62/ 580-318

Aktualitások!

A betakarítás közeledtével vagy akár végeztével sokan már nem fordítanak kellő figyelmet az állományok védelmére. Ez különösen érvényes a leszedett gyümölcsösökre. Sok az elgazosodott, letetvesedett őszibarack, blumeriella által megkopaszodott meggyes.

Kérem, fordítsanak figyelmet betakarítást követően is ültetvényükre. A következő évi munkájukat könnyítik meg, ha karbantartásként elvégzik a szükséges növényvédelmi munkákat. Gyümölcsösökben ilyenkor lenne lehetőség a foszfor és kálium hatóanyagok pótlására is egy viszonylag olcsóbb árfekvésű műtrágyával.

Az őszi kétszeri rezes lemosó permetezés egyszer 50 %-os lombhullásban, majd teljes lombhullást megközelítő állapotban, lemosás szerűen- gomba egyedszám csökkentő hatásán túl, a vesszők beérésére is jótékony hatású.

Gyakori kérdés, hogy az érést melyik kultúrában mivel lehetne -tápoldattal, lombtrágyával- gyorsítani.: A kálium túlsúlyos műtrágyákkal a növények generatív, tehát a termésképzés irányába befolyásolhatók. Amennyiben még jó lenne a termés növekedésére is, vagy pl. paprikánál a későbbi kötések fejlődését kívánjuk még segíteni, úgy egy kálium-nitrát -egy rész nitrogénhez 3,5 szeres kálium aránylik-, megfelelő, ha csak érést kívánunk gyorsítani, akkor egy tágabb nitrogén-kálium arányú műtrágyát alkalmazzunk, mely például a Megasol narancs ahol ez az arány 1:8.

A betárolásra szánt termények egészségmegőrzése különösen fontos, mivel csak ép, egészséges terményt érdemes betárolni, s ezen termények káliumos feltöltését is célszerű elvégezni, mert a kálium a sejtekben lévő víz arányt számunkra kedvezően befolyásolja, s javul a tárolhatóság.

Burgonyánál a későbbi vetések különösen fogékonyak a párás éjszakák miatt a burgonyavészre.

Paradicsomnál a paradicsomvészen kívül különösen fólia alatt a botrytis fertőz még, ellene akár külön is érdemes lehet védekezni. A Rovral, Sumilex, Teldor közül bármelyiket választhatjuk botrytis ellen. Paprikában szintén felléphet, s fajtától, tápanyag ellátottságtól, illetve annak arányától függően a rossz bibezáródás miatt fellépő magház penész ellen is a botrytisre engedélyezett szerek javasolhatók.

Gyökérzöldségekben a talajban a pythium garázdálkodik, ellene Fosfitex javasolt, míg a lombon az alternária és a lisztharmat okoz gondot. Alternária ellen mancoceb hatóanyagú készítmények, így a Dithane,Vondozeb stb illetve azok kombinációi jó hatásfokkal alkalmazhatók, de minden esetben egészítsük ki Bio-filmmel, amely az esőállóságát nagymértékben fokozza, ez a reggeli harmatok miatt is szükséges.

A gabonatarlók állapotára is ügyeljünk. A parlagfű igen gyorsan kifejlődik rajta, s komoly pénzbírsággal súlytják a terület gazdáját. Tárcsázással, vagy valamelyik glifozát hatóanyagú totális gyomirtó szerrel védekezhetünk ellene.

Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

DRÓTFONAT
Horganyzott és PVC-bevonatos fonatok , hegeszthető hullámfonatok gyártása, értékesítése **olcsó áron**! *Ingyenes házhozszállítás!* *Tel: (62) 584-372*

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE

- PARKOK
- FÓLIA SÁTRAK
- SZÁNTÓFÖLDEK
- GYÜMÖLCSÖSÖK

ÖNTÖZÉSÉNEK TERVEZÉSE A KIVITELEZÉSIG

Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.

Tel.: 30/ 515-66-24

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó Baks, Csanytelek, Csólyospálos, Dóc, Kistelek, Kömpöc, Ópusztaszer, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis Nagy Áruháza Kft. Felelős kiadó: Knipf Róbert Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel./fax: 62/580-316 E-mail:knipfrobert@vnet.hu